

## โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

โรคไข้เลือดออก : เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมียุงลายที่เป็นพาหะนำโรคในประเทศไทยจะพบโรคไข้เลือดออกได้ประปรายตลอดทั้งปี แต่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงฤดูฝนโรคนี้จะพบในเด็กได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่

การติดต่อ : ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ที่มีเชื้อเป็นพาหะแพร่กระจายโรคยุงชนิดนี้จะกัดดูดเลือดคน ในเวลากลางวัน และแพร่พันธุ์โดยวางไข่ในน้ำสะอาดตามภาชนะที่มีน้ำขังภายในและรอบๆบ้าน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ ถังน้ำ แจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์ กะลากระป๋อง ฯลฯ

การป้องกัน : หลีกเลี้ยงไม่ให้ยุงลายกัดซึ่งปกติยุงจะกัดกินเลือดคนเวลากลางวัน เช่นนอนในมุ้งหรือมุ้งลวดทายากันยุงกรณีเด็กป่วยเป็นไข้เลือดออกแยกผู้ป่วยขณะมีไข้ไว้ในบริเวณที่ไม่มียุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์กำจัดยุงเต็มวัยในห้องและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกสัปดาห์

